



ประเภท : รู้ไว้คลายสงสัย

หัวข้อข่าว : รับมือไวรัสอันตรายโรคไข้ชิกกา

โดย : Adean

ลงวันที่ : พุธ ที่ 3 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559

เข้าชม : 2193

ระวัง! ZIKA FEVER โรคใหม่ ไร้ยางอาย

โรคไข้ซิกา (Zika fever) เกิดจากการติดเชื้อไวรัสซิกา
จำพวกเดียวกับไวรัสไข้เหลือง ไวรัสเดงกี ไวรัสเวสต์ไนล์

โดยมี **ยุงลาย** เป็นพาหะนำ



ระยะฟักตัว

เฉลี่ย 4-7 วัน





มาตรการ ป้องกันและควบคุม

โรคไข้ซิกา

ในประเทศไทย



01

การเฝ้าระวัง
ทางระบาดวิทยา

02

การเฝ้าระวัง
ทางกวีวิทยา

กระทรวงสาธารณสุข
ของประเทศไทย ได้กำหนด
ให้มีการเฝ้าระวัง

โรคไข้ซิกา
4 ด้าน

03

การเฝ้าระวังทารก
แรกเกิดที่มีความพิการ
แต่กำเนิด

04

การเฝ้าระวัง
กลุ่มอาการ
ทางระบบประสาท

การป้องกัน
ยุงลายพาหะ
นำโรคไข้ซิกา
โดยใช้หลัก
3 เก็บ

01 เก็บบ้าน

ให้สะอาดเรียบร้อย
ไม่ให้มีมุม
อับทึบ



02 เก็บขยะ

เพื่อไม่ให้เป็นที่
เพาะพันธุ์ของ
ยุงลาย



03 เก็บน้ำ

ปิดฝาภาชนะเพื่อ
ป้องกันยุงลาย
วางไข่







ยุงลาย พาหนะนำ โรคไข้ชิก้า

ยุงลายบ้าน (Aedes aegypti)
ตัวการสำคัญที่เป็นพาหนะนำโรคไข้ชิก้า และสามารถแพร่ระบาดของโรคไปในวงกว้างได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยุงลาย ยังเป็นพาหนะนำโรคไข้เหลือง ไข้เลือดออก ไวรัสชิคุนกุน และเป็นพาหนะนำเชื้อไวรัสฮิสตาหลายชนิด









“โรคไข้ชกา

สายพันธุ์อันตรายที่ต้อง

โรคไข้ชกา (Zika Fever) เกิดจากการติดเชื้อไวรัสชกา (Zika Virus-ZIKV) โดยมี
เป็นอีกหนึ่งโรคอันตรายที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบสมองโดยเฉพาะเด็กในครรภ์เมื่อได้รับ
สมองผิดปกติ เช่น สมองเล็ก แคระเกร็น พัฒนาการช้า ตัวเล็ก



การแพร่เชื้อของไวรัสชกา
สามารถแพร่เชื้อโดยยุงลายที่มีเชื้อ
และไปกัดคน หลังจากได้รับเชื้อ
แล้วเชื้อจะมีระยะฟักตัว 3-12 วัน



อาการของผู้



การรักษาโรคไข้ชกา

ปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนป้องกันเฉพาะ

การรักษาจะทำการรักษาตามอาการ





10 เรื่องน่ารู้

เกี่ยวกับ โรคไข้ซิกา

Zika Fever



1.



โรคไข้ซิกา เกิดจากการติดเชื้อไวรัสซิกา อยู่ในตระกูลฟลาวิไวรัส (flavivirus) จำพวกเดียวกับ ไวรัสไข้เหลือง ไวรัสแดงก๊ ไวรัสเวสต์ไนต์ และไวรัสไข้สมองอักเสบเจอี มีอยู่กลายเป็นพาหะนำโรค

2.



เชื้อไวรัส ในน้ำฝน ป่าชื้น ไข้เหลือง

3.



โรคไข้ซิกามีระยะฟักตัวเฉลี่ย 4-7 วัน สั้นสุด 3 วัน และยาวสุด 12 วัน

4.



อาการ ตามัว อ่างมือ ปวดศีรษะ และอ

5.



หญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับเชื้อโรคไข้ซิกา อาจทำให้เด็กทารกที่คลอดมามีสมองเล็ก (microcephaly) หรือมีภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์

6.




โรคไข้ซิกา ตั้งแต่

7.



โรคไข้ซิกายังไม่มีวัคซีนป้องกันเฉพาะ การรักษาจะรักษาตามอาการ เพื่อบรรเทาอาการเจ็บป่วย

8.



โรคไข้ซิกา แต่อาจทำให้



การป้องกันตัวเอง ให้ปลอดภัยจาก โรคไข้ชกา



ยุงและการขยายพันธุ์ของยุงเป็นสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงการติดต่อของโรคชกา การป้องกันตัว
จากโรคไข้ชกาสามารถทำได้ด้วยวิธีง่ายๆ ดังนี้









การวินิจฉัย



และการรักษา

โรคไข้ซิกา



การตรวจวินิจฉัย ไวรัสซิกาทางห้องปฏิบัติการ



สามารถส่งตัวอย่าง เพื่อตรวจสอบพันธุกรรมได้ที่



1. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
2. สถาบันบำราศนราดูร
3. เครือข่ายทางห้องปฏิบัติการ เช่น มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1. การตรวจสอบสารพันธุกรรมด้วยวิธี PCR (Polymerase Chain Reaction)
2. การแยกเชื้อไวรัสซิกาจากตัวอย่าง สำหรับการตรวจแอนติบอดีที่จำเพาะก่อนข้างยาก เนื่องจากไวรัสซิกามีกับไวรัสที่ก่อโรคอื่น เช่น โรคไข้เลือดและไข้เหลือง

การรักษา

การรักษาโรคไข้ซิกา ป
ป้องกันหรือยารักษา
มีอาการไม่รุนแรง สามารถ

1. พักผ่อนให้เพียงพอ



2. ดื่มน้ำมากๆ



3. รักษาตามอาการ เช่น เมื่อมีไข้ ปวดศีรษะ ไข้ยาลดไข้ หรือยาบรรเทาอาการปวด

4. ผู้ป่วย



อันตราย! ของโรคไข้ซิกา ในหญิงตั้งครรภ์ และ เด็กทารก



ไวรัสร้าย ที่มีอยู่กลายเป็นพาหะนำโรค เป็นเชื้อไวรัสในตระกูลเฟลวivirus (flavivirus) ที่ส่งผลกระทบต่อ



หญิงตั้งครรภ์ที่ได้

และป่วยเป็นโรคซิกา มีโอกาสเสี่ยง
ทารกที่อยู่ในครรภ์มีความผิดปกติ

- มีภาวะศีรษะเล็กแต่กำเนิด
- แคระแกร็น
- มีพัฒนาการช้า

รู้หรือไม่?

ปี 2558 ที่



ประเทศโคลอมเบียมี
การคาดการณ์ว่าการระบาดของ
ของไวรัสซิกาอาจทำให้มีผู้ป่วย
ถึง 600,000-700,000 คน



ประเทศบราซิล
ภาวะฉุกเฉิน
แรกเกิดติดเชื้อ
ผิดปกติทางสมอง

สาเหตุหลัก
ของการติดเชื้อไวรัสซิกา







คำแนะนำเมื่อต้องเดินทาง
ที่มีการระบาดของ

โรคไข้ซิกา

จากรายงานการแพร่ระบาดของโรคไข้ซิกา (Zika virus disease) ณ วันที่ 16 มกราคม 2559 พบผู้ป่วยยืนยันการติดเชื้อไข้ซิกา 20 ประเทศ ในทวีปอเมริกาและประเทศในกลุ่มประเทศลาตินอเมริกา และแคริบเบียน ในทวีปเอเชียพบผู้ติดเชื้อในแถบประเทศอินเดีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย เวียดนาม อินโดนีเซีย







รับมือไวรัส โรคไข้



อย่าให้ยุงกัด

ป้องกันตนเองอย่าให้
ถูกยุงกัดด้วยการนอนกางมุ้ง
ทายากันยุง รวมไปถึงการ
ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง
ตามแหล่งต่างๆ

อย่ากิน ยาแอสไพริน

แนะนำให้กินยาพาราเซตามอล
ห้ามกินยาแอสไพริน หรือยา
กลุ่มลดอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์



หญิงตั้งครรภ์เสี่ยง “โ

อาการ

มีไข้ ออกผื่น ตาแดง

อาการร่วม : อ่อนเพลีย ป

ต่อมน้ำเหลืองโต อุจจาระร

กลุ่มเสี่ยง

หญิงตั้งครรภ์อาจส่งผล

ทำให้เกิดมี**สมองเล็ก**

หรือมีภาวะแทรกซ้อนระ

ป้องกัน

ป้องกันไม่ให้ยุง**กัด**